

**Пакет индикаторов мониторинга реализации Национальной программы «Манас таалими» за 2010 год**

ИНДИКАТОР	Источник данных	2004 Исходный	2005	2006	2007 Средне-срочный обзор	2008	2009	2010		Комментарии
								цель	факт	

**ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА – ПРОФИЛАКТИКА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ**

**А. ОЖИДАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ**

Влияние на сердечно-сосудистую заболеваемость	Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди 30-39 лет	РМИЦ	55,0	55,8	56,1	60,3	54,2	51,7	53,8	51,5 (окончательные данные будут получены из НСК в июне 2011 г.)	Целевые значения показателей смертности от ССЗ в возрастных группах 30-39 и 40-59 лет за 2010 год достигнуты. Таким образом, как и планировалось, идет процесс относительной стабилизации показателей смертности от ССЗ с тенденцией к их снижению. Данная ситуация объясняется начатыми мероприятиями по реализации Комплексной программы контроля ССЗ в КР, включающими действия по интегрированию кардиологической службы в первичное звено здравоохранения (позападное открытие оснащенных областных кардиологических кабинетов), обучению, переобучению специалистов (по специальности «Кардиология с основами ЭКГ»), а также проведению образовательной кампании для населения по борьбе с факторами риска ССЗ и внедрению принципов здорового образа жизни.
	Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди 40-59 лет	РМИЦ	306,6	312,2	333,7	346,4	329,3	309,6	328,7	309,4 (окончательные данные будут получены из НСК в июне 2011 г.)	

**В. ОЖИДАЕМЫЕ СЛЕДСТВИЯ ПРОГРАММЫ: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА**

Следствие программы: Улучшение качества помощи	Уровень госпитальной смертности (в сроках до 14 дней после ОИМ)	НЦКТ Обзор карт пациентов	-	-	-	11,48	10,0	-	9,8	-	Повторное исследование не проводилось.
	Уровень госпитальной смертности (до 28 дней от начала)	Обзор карт пациентов	-	-	-	-	31,2	-	30,0	-	Повторное исследование не проводилось.

**Пакет индикаторов мониторинга реализации Национальной программы «Манас таалими» за 2010 год**

ИНДИКАТОР	Источник данных	2004 Исходный	2005	2006	2007 Средне-срочный обзор	2008	2009	2010		Комментарии
								цель	факт	

	ишемического инсульта)										
	Уровень госпитальной смертности (до 28 дней от начала геморрагического инсульта)	Обзор карт пациентов	-	-	-	-	46,8	-	45	-	Повторное исследование не проводилось.
	Частота повторных ОИМ и инсульта (включить в МКБ)	НЦКТ (Док.№45, повт иссл.)	-	-	-	18,85 ОИМ 18,25 инс.	-	-	15,0 15,0	-	Повторное исследование не проводилось.
	Частота повторных инсультов в % (инсульт, развившийся позже 28 дней от предыдущего)	Обзор карт пациентов	-	-	-	-	35,2	-	34	-	Повторное исследование не проводилось.

**С. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ**

Поведение населения изменилось в отношении ключевых риск - факторов ССЗ таких, как курение и избыточный вес	% населения, курящего по крайней мере одну сигарету в день каждый день среди населения старше 18 лет	КИОД НЦКТ	-	-	-	55 (м) 5 (ж)	55 5	57,8 4	52 2	-	Результаты последнего обследования показывают, что процент курящих среди мужчин составил 57,8% , что не достигает целевого показателя, установленного для 2009 г. (55%). Процент курящих среди женщин составил 4%, что демонстрирует достижение целевого показателя для 2009 г. (5%).
	% населения, имеющего ожирение (BMI>30)	КИОД НЦКТ	-	-	-	13,1	13,0	10	12,0	-	По результатам последнего обследования % населения, имеющего ожирение, составил 10%, что демонстрирует достижение цели, установленной для 2009 г. (13%)
Система здравоохранения работает эффективно относительно	% тех, кто знает о том, что у них ГБ	КИОД (Док.№44 повт иссл.)	-	-	-	26,5	26,5	33,1	33,0	-	Результаты последнего обследования показывают положительную динамику данного показателя. За период с 2006 по 2009 гг. отмечен его рост с 26,5 до 33,1%, что значительно превышает намеченный целевой показатель.

**Пакет индикаторов мониторинга реализации Национальной программы «Манас таалими» за 2010 год**

ИНДИКАТОР	Источник данных	2004 Исходный	2005	2006	2007 Средне-срочный обзор	2008	2009	2010		Комментарии
								цель	факт	

но повышения осведомленности населения об уровне АД и обеспечения того, что лица, имеющие гипертонию, регулярно принимают гипотензивные препараты	<b>% тех, кто получал лечение в последние 24 часа из тех, у кого ГБ</b>	КИОД (Док.№44 повт иссл.)	-	-	-	17,1	-	14,4	22,0	-	По результатам последнего обследования, данный показатель не достиг целей, намеченных на 2009 г. (18,0). Несмотря на улучшение осведомленности населения о наличии у них ГБ, процент пациентов, получавших лечение в последние 24 часа снизился с 17,1% в 2006 г. до 14,4% в 2009 г. Данная тенденция, возможно, связана с сокращением использования лекарственных средств из-за последствий мирового экономического кризиса, в т.ч. в Кыргызстане (рост безработицы, возвращение мигрантов и т.п.).
	<b>% взрослого населения с ГБ, состоящего на учете на уровне ПМСП</b>	РМИЦ	3,0 -	3,4 -	3,3 -	3,5 9	3,3 9	3,7 -	- 15	3,9 (РМИЦ) -	Показатель имеет тенденцию к росту в связи с улучшением выявляемости больных на уровне ПМСП, однако остается достаточно низким.
Лечебные мероприятия основаны на доказательствах на всех уровнях оказания помощи	<b>% пациентов, госпитализированных в первые 12 часов после появления симптомов</b>	НЦКТ, КИОД Обзор карт пациентов (Док.№45 повт иссл.)	-	-	-	19,3	-	-	25,0	-	Повторное исследование не проводилось.
	<b>% пациентов с ОИМ, получивших аспирин и гепарин на догоспитальном этапе</b>	НЦКТ Обзор карт пациентов (Док.№45 повт иссл.)	-	-	-	3,2	-	-	15,0	-	Повторное исследование не проводилось.
	<b>% пациентов с ОИМ и элевацией ST, получивших тромболитическую терапию</b>	НЦКТ Обзор карт пациентов	-	-	-	16,5	18,3	-	25,0 (зависит от наличия препаратов)	-	Повторное исследование не проводилось.
	<b>% пациентов с ОИМ, получивших</b>	НЦКТ Обзор карт	-	-	-	73,0	-	-	85,0	-	Повторное исследование не проводилось.

**Пакет индикаторов мониторинга реализации Национальной программы «Манас таалими» за 2010 год**

ИНДИКАТОР	Источник данных	2004 Исход- ный	2005	2006	2007 Средне- срочный обзор	2008	2009	2010		Комментарии
								цель	факт	
аспирин, гепарин, бета-блокаторы и инг.АПФ в стационаре	пациентов (Док.№45 повт иссл.)									
% пациентов с ОКС, получивших статины при выписке	(Док.№45 повт иссл.)	-	-	-	17,5	66,0	-	70,0 (зависит от наличия препаратов)		Повторное исследование не проводилось.

Примечание “-” нет данных (отсутствие исследований)