

ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА – ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ/СПИДа, ИППП (инфекций, передающихся половым путем)

ИНДИКАТОР	Источник данных	2004 Исходный	2005	2006	2007 Средне-срочный обзор	2008	2009	2010		Комментарии	
								цель	факт		
А. ОЖИДАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ: ВИЧ/СПИД											
Снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности населения за счет ограничения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, ИППП и наркомании	Процент ВИЧ-инфицированных среди ИПН (инъекционных потребителей наркотиков)	РО СПИД	6,2%	8%	7,4%	7,7%	6,7%	14,33%	<10%	14.6%	При проведении исследований методом RDS были охвачены глубинные слои ИПН. С учетом данных рутинного исследования сравнительно с 2009 г. в 2010 г. наблюдается незначительный рост ВИЧ-инфекции среди ИПН.
	Процент ВИЧ-инфицированных среди РС (секс-работников)	РО СПИД	1,7%	1,1%	1,4%	1,12%	1,94%	1,6%	<5%	3.5%	По данным проведенного ДЭН в 2010 г. распространенность ВИЧ среди РС возросла с 1,6% до 3,5%, что говорит о существующей угрозе распространения полового пути.
	Процент ВИЧ-инфицированных среди МСМ (мужчин имеющих секс с мужчинами)	РО СПИД	2,7%	0,4%	3,5%	11,7%	4,8%	-	<5%	1,1%	В 2010 г. по результатам проведенного ДЭН среди МСМ данные распространенности ВИЧ среди МСМ значительно ниже показателей предыдущих лет.
В. ОЖИДАЕМЫЕ СЛЕДСТВИЯ ПРОГРАММЫ: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА, доступности, справедливости											
Следствие программы №1: Улучшение доступности и равноправия в доступности	Процент беременных женщин, получивших консультирование и прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию	РО СПИД	15.3%	6.8%	18.6%	37.1%	76%	93,5%	80%	84%	Согласно приказу МЗ КР от 13.11.07 №400 проводится обязательное тестирование на ВИЧ (с информированного согласия) взятых на учет беременных для своевременного выявления и назначения АРВ химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ. Снижение произошло за счет Чуйской, Жалал-Абадской и Таласской областей.
С. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ											
Усиление деятельности по профилактике ВИЧ/СПИДа	% ключевого населения, охваченного проф. программами, в т.ч.:										Данные ДЭН будут готовы к 31 мая 2011 г.
	ИПН	РО СПИД	23.3%	13.6%	17.6%	36.4%	-	38,44%	> 60%	-	

	СР	РО СПИД	80%	32.7%	26%	27.3%	-	60,96%	> 60%	-	
	МСМ	РО СПИД	44%	12%	9%	15.6%	-	-	> 60%	-	
	% ПИН, указавших на использование стерильного инъекционного инструментария во время последней инъекции	РО СПИД	71%	90%	77%	39%	48%	-	>70%	67%	Увеличилось количество ПИН, использующих стерильный инъекционный инструментарий.
	% РС, указавших на использование презерватива во время полового контакта с последним клиентом	РО СПИД	57.8%	86.5%	83%	82%	95%	93,9%	>85%	-	Данные ДЭН будут готовы к 31 мая 2011 г.
	% МСМ, указавших на использование презерватива во время полового контакта с последним клиентом, когда имели анальный секс	РО СПИД	100%	100%	100%	80%	100%	-	>85%	65%	Число МСМ, указавших использование презерватива во время последнего полового контакта, уменьшилось до 65%.
Увеличение охвата и улучшение качества медицинской помощи лицам, живущим с ВИЧ (ЛЖВ)	% ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших АРВ профилактику	РО СПИД	100%	61,5%	56,2%	28,5%	74,3%	54,2%	85%	88%	В результате проведенной работы по организации проведения химиопрофилактики беременным во всех регионах страны, данный показатель улучшился. В 2010 г. взято на учет 78 ВИЧ-позитивных беременных, из них 01.01.11 пролонгируют у 35 женщин (в т.ч. 18 начата ППМР, у 17 срок не подошел), роды отмечались у 37 и аборт - у 6 женщин. Профилактику антиретровирусными препаратами получили 33 ребенка (89%) и 32 матери (86%).
	% ЛЖВ (лиц живущих с ВИЧ) нуждающихся в ВААРТ	РО СПИД	-	11,2%	13,1%	16,0%	16,1%	15,6%	>30%	20.8%	Увеличивается количество нуждающихся в лечении за счет внедрения новых протоколов лечения, улучшения качества диспансеризации и более раннего

											назначения АРВ терапии.
% взрослых и детей с ВИЧ-инфекцией, получающих ВААРТ	РО СПИД	-	67,6%	43,5%	47,3%	59,0%	60,5%	70%	65%	На конец 2010 г. 547 ЛЖВ назначена АРВ терапия, получают 356, в т.ч. 137 детей.	
% взрослых и детей с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции, получающих ВААРТ (высокоактивную антиретровирусную терапию)	РО СПИД	-	68,8%	29,8%	42,5%	37,0%	57,6%	60%	83,4%	Из 547 ЛЖВ, которым назначено лечение, получают 356, из них с продвинутой стадией 297. Снижение этого показателя получено за счет применения новых рекомендаций ВОЗ по лечению. Лечение назначается раньше, по клинике и при CD4-350 (раннее 250-200).	
% ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые продолжают получать АРВТ спустя 12 месяцев после его начала	РО СПИД	-	-	10,6%	9,2%	42,2%	72,8%	80%	82,2%	Показатель улучшился за счет улучшения диспансерного наблюдения своевременного назначения ВААРТ, выработки приверженности к лечению.	