Приоритетная программа: сокращение заболеваемости и смертности от туберкулеза и заболеваний органов дыхания благодаря эффективному выполнению стратегий DOTS и PAL

	Индикатор	Источник	2004 Исход- ный	2005	2006	2007	2008	2009		Комментарии
		данных						цель	факт	<u>'</u>
А. ОЖИДАЕМОЕ ВО Сокращение смертности и заболеваемости ТБ и заболеваниями органов дыхания путем эффективного выполнения стратегий DOTS и PAL	ЗДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ Заболеваемость ТБ (общее население/включая заключенных)	РМИЦ	113.6 /128.1	115.7 /125.3	110.9 /121.2	108.8 /115.5	101,6 /106.3	105.8/106.1	100,9/103,9	За 2009 год заболеваемость составила 100,9 /103,9 на 100 тыс. населения.
	Смертность от ТБ (общее население/вкл. заключенных)	РМИЦ	11,2 /14,1	11,0 /14,1	10,2 /12,8	9,6 /11,2	9,2 /9,9	9,2 /9,9	8,7 /9,3	За 2009 год смертность от туберкулеза составляла 8,7/9,3 на 100 тыс. населения.
В. ОЖИДАЕМЫЕ РЕ	ЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: К	АЧЕСТВО, ДО	СТУПНОС	гь, улучц	ЈЕНИЕ ЭФ	ФЕКТИВН	ОСТИ			
Воздействие программы #1: Более доступные услуги по ТБ	% зарегистрированных ТБ-пациентов, получивших DOTS-терапию - общее население - заключенные	Националь- ный институт ТБ (НИТБ)	99,6 100	99,3 100	99,5 100	99,2 100	99,7 100	100%	100%	Данный показатель достигнут за счет полного внедрения ДОТС на территории всей республики, включая систему ГСИН.
	% зарегистрированных пациентов с мультирезистентной формой ТБ, получивших лечение по DOTS + - общее население - заключенные	НИТБ		- -		- -	12,6% 9,6%	32,4% 13,9%	32,4% 13,9%	Показатель достигнут. По итогам 2009 года на лечение по ДОТС+ взято 1030 пациентов с МЛУ-ТБ.
	% запущенных случаев ТБ	НИТБ	2,7	2,0	1,4	1,7	1,3	% снижения	1,1%	Показатель достигнут за счет раннего выявления случаев ТБ.

Воздействие программы #2: Рост эффективности услуг	% успешного лечения: DOTS DOTS +	НИТБ	85,3 -	84,7	82,3 -	84,7	84,6	85	-	По итогам 2008 года показатель достигнут на 99,5% и составил 84,6%, близкий к нормативам ВОЗ – 85%. Данные за 2009 г. будут получены по итогам 2010 г.
	% рецидивов	НИТБ	6,5	6,6	7,2	7,1	7,0	% снижения	5,8%	За 2009 год % рецидивов составил 5,8%.
Воздействие программы #3: Рост эффективности услуг	% случаев ТБ, выявленных на уровне ПМСП	НИТБ	7,3	8,6	9,0	11,6	9,2	5 - 10	8,5%	За 2009 год показатель выявляемости БК (+) на первичном звене – 8,5%.
С. ОЖИДАЕМЫЕ Г Рост эффективности противотуберку- лезных услуг	ІРОДУКТЫ ПРОГРАММЫ Выявление положительных мазков среди пульмональных форм ТБ	НИТБ	45,3	47,3	46,4	44,1	44,1	50	40,2%	Среди новых случаев ТБ легких процент бациллярных форм составляет 40,2%. Не достигнуто намеченных 50% из-за отсутствия качественного (контролируемого) сбора мокроты и недовыявления лабораторной службой положительных мазков.
Усиление межотраслевого сотрудничества	Количество медицинского персонала и персонала ГУИН, обученного стратегии DOTS и профилактике ТБ	НИТБ	-	-	-	-	57	Рост	60	Охват обучением медперсонала в системе ГСИН 100%.
	Количество заключенных, обученных профилактике ТБ	нить	-	-	-	-	65	Рост	70	Увеличивается число охвата заключенных обучению профилактике ТБ.